

SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO CANTONALE (SDS 2011-2014) - Circondari nr. 39-45 - Vezia, sett. 2012
Cr.nr.39: scuole elementari di Comano Nucleo, Comano Tavesio, Cureglia, Porza Tavesio, Porza Trida
Cr.nr.45: scuole elementari di Origlio e Ponte Capriasca

INFORTUNI CON FRATTURE O PERDITA DI DENTI: INFORMAZIONI GENERALI

DENTOSAFE

Si tratta di un piccolo contenitore nel quale riporre il dente perso, con un liquido che riproduce al meglio le condizioni naturali, per proteggere e conservare (vive) le cellule del parodonto (che assicurano l'ancoramento all'osso) e della polpa (vasi e nervo), è quindi molto più efficace dei metodi tradizionali (latte, ovatta umida ecc.). Il dente riposto va comunque reimpiantato al più presto, non oltre le 2 ore. Si prega di conservarlo in un posto accessibile e conosciuto da tutti gli addetti, va sostituito in base alla data di scadenza alcuni giorni prima, i costi sono piuttosto limitati (la prima confezione è offerta dal mio studio). Sarebbe opportuno organizzare una informazione direttamente nelle scuole, idealmente tramite l'assistente di profilassi:

-dentosafe, nozioni di base ma soprattutto procedure e organizzazione (dove si trova e chi allertare)
-infortuni ai denti (si veda sotto nel dettaglio), questo riassunto potrebbe essere plastificato e conservato in caso di urgenza, ma anche utilizzato per l'istruzione.

blu: recarsi subito dal dentista - verde: appena possibile

IN CASO DI PERDITA

Dente permanente (può essere reimpiantato entro 2 ore):

1. non toccare con le mani la radice, recuperare il dente tenendolo per la corona
2. non pulire o disinfettare
3. riporlo nell'apposito contenitore dentosafe (conservato a scuola); in alternativa nel latte, in una ovatta umida o in bocca (attenzione a non deglutirlo)
4. recarsi dal dentista al più presto, idealmente non oltre le 2 ore
5. annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o l'assicurazione complementare (infortuni)

Dente di latte (deciduo): non può essere reimpiantato; recarsi però dal dentista e annunciare all'ass.

IN CASO DI FRATTURA, DOLOROSA O CON SPOSTAMENTO (LUSSAZIONE)

Dente permanente

1. recuperare il frammento, se possibile
2. recarsi subito dal dentista (medicazione/cura radice; riposizionamento; fissazione)
3. annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o l'assicurazione complementare (infortuni)

Dente deciduo (di latte): recarsi dal dentista appena possibile; annunciare all'assicurazione

IN CASO DI SCALFITURE O FRATTURE DI LIEVE ENTITÀ NON DOLOROSE

Dente permanente e deciduo (di latte)

1. recarsi dal dentista appena possibile
2. annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o l'assicurazione complementare (infortuni)

IN CASO DI CONTUSIONE (COLPO) SENZA FRATTURE O PERDITA:

Dente permanente, se risulta spostato (lussato) o la mobilità chiaramente aumentata e dolorosa

1. recarsi subito dal dentista, il dente va riposizionato e temporaneamente fissato
2. annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o l'assicurazione complementare (infortuni)

Dente permanente, non spostato (lussato) e con la mobilità nella norma, anche se doloroso

1. recarsi dal dentista appena possibile
2. annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o l'assicurazione complementare (infortuni)

Dente deciduo (di latte): fino ai 2-3 anni può eventualmente essere temporaneamente fissato

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento supplementare, anche in caso di effettiva urgenza (si veda anche cartina sul retro). y.campana

